



## LES 7 RÈGLES D'OR DU BCG

La vaccination par le BCG permet d'éviter les formes graves de la tuberculose chez l'enfant (méningite et septicémie).

Elle n'est plus obligatoire, mais reste très fortement recommandée dans certaines circonstances ; en particulier, dans les régions où le risque de tuberculose est encore important.

Dans les semaines qui suivent une vaccination par le BCG, la zone autour de l'endroit où a été faite la piqûre est souvent un peu dure au toucher. Parfois, une ulcération et un petit écoulement de liquide surviennent. Un ganglion peut aussi apparaître sous le bras vacciné. En général, toutes ces réactions disparaissent, au plus tard en quelques mois, en ne laissant qu'une discrète cicatrice.

### **Votre enfant a été vacciné par le BCG, voici les 7 règles d'or à suivre :**

#### Règle n°1

Laissez le bras vacciné à découvert le plus souvent possible, pour faciliter la cicatrisation.

#### Règle n°2

Mettez des vêtements qui ne serrent pas l'endroit où la piqûre a été faite.

#### Règle n°3

S'il s'écoule un peu de liquide à l'endroit où la piqûre a été faite, appliquez simplement une compresse sèche et stérile.

#### Règle n°4

N'APPLIQUEZ AUCUNE POMMADE, NI TALC, NI AUCUN AUTRE PRODUIT à l'endroit où la piqûre a été faite ni sur le ganglion.

#### Règle n°5

Ne donnez aucun antibiotique.

#### Règle n°6

Le bain et la douche sont autorisés dès le jour de la vaccination. En revanche, évitez les baignades en piscine ou à la mer s'il s'écoule un peu de liquide à l'endroit où la piqûre a été faite.

#### Règle n°7

Consultez votre médecin si :

- la zone dure au toucher (apparue autour de l'endroit où la piqûre a été faite) mesure plus de 3 cm.
- votre enfant est gêné dans ses mouvements.
- le ganglion, qui est apparu sous le bras, est visible à l'œil nu et ramolli (suppuration).